

La vida productiva de los conejos

Juan Martín Molinero Zapatero

En la literatura sobre esta materia se presta poca atención acerca de este tema, siendo evidente que la prolongación de la misma no sólo reduce el número de renovaciones, sino también el porcentaje de primera y segunda camada, y a su vez, el porcentaje de problemas de fertilidad aumentando consecuentemente el número de camadas.

Según Comfort (1965), la duración de la vida en esta especie puede sobrepasar los 15 años, citando casos de 10 y 14 años, los cuales eran todos machos. En condiciones de laboratorio ambos sexos muestran signos de envejecer a los 6-7 años y los machos a dicha edad aún producen semen, pero de baja calidad —con menos de 10 millones de espermatozoides por mm³, frente a los 200/250 millones por mm³. en los jóvenes.

El período de la vida reproductiva de las hembras raramente excede los 5 años, siendo una de las causas principales los tumores uterinos, la incidencia de los cusles depende de la edad, pasando de un 4,2 por ciento en hembras de 2 a 3 años, a un 79 por ciento o más en hembras de 5 a 6 años.

En los conejos la pubertad aparece a los 4-6 meses de vida y en condiciones normales la productiva de una hembra o de un macho es de unos 3 años aproximadamente y el promedio de una granja es de 2 años de producción.

Para la eliminación de las hembras improductivas o de los machos indeseables se necesita una información muy precisa y un buen registro.

La vida productiva está relacionada con el porcentaje de renovación, existiendo dos razones para reemplazar los animales: ferti-

lidad y estado sanitario. En la fertilidad o número y peso de los gazapos nacidos, que es una característica determinada por el número de óvulos madurados y fecundados con capacidad de supervivencia y desarrollo en el claustro materno, podemos considerar tres etapas:

1.^a. Desarrollo de celo en nulíparas y multíparas.

—Cuando se presenta la hembra al macho varios días y no es aceptada, a la quinta vez debe ser eliminada.

—Con un manejo correcto, la hembra que el intervalo entre 2 partos supere los 50 días, conviene eliminarla.

2.^a. Fertilización e implantación del óvulo.

—Si después de 3 cubriciones consecutivas, la hembra no queda gestante —comprobación mediante palpación—, debe ser eliminada.

3.^a Partos normales de conejos vivos.

—Es uno de los sistemas más efectivos de eliminación de hembras medido por la producción de gazapos vivos en determinado número de partos.

Como dato orientativo susceptible de ser superado, indicaremos:

N.º de partos seguidos	Eliminar la ♀ que pare menos
2	5 gazapos vivos
3	10 gazapos vivos
4	15 gazapos vivos

Las primeras camadas de una coneja suelen ser pequeñas pero se comprueba esta misma circunstancia tanto en conejas demasiado jóvenes como excesivamente viejas.

Es también necesario realizar una evalua-

(Continúa en página 100)



Lerbek 


**El coccidiostático
eficaz y más seguro
en cunicultura.**



*Marca Registrada - The Dow Chemical Company.

DOW CHEMICAL IBERICA S.A. AVDA. DE BURGOS, 109. TELS. 766 12 11 • 766 14 11 • 28050 MADRID

Cada día hay más granjas hylanderas



PARA LA CUNICULTURA INDUSTRIAL, OPTE POR
HYLA NO LO DUDE

Y para la cunicultura rural,
MASSILA



Exclusivista para España de los reproductores HYLA:

HISPANHIBRID S.A

Afores, s/n. Tel.: (977) 63 80 00
VILA-RODONA (Tarragona)

DISTRIBUIDORES:

Zona de ASTURIAS, LEON Y ZAMORA:
MIGUEL PELLITERO. Paseo Blanco Ceta, 15.
ASTORGA (León). Tel.: 987-615616

Zona de GALICIA:
CUNICOOP. Puente, 50. PETIN DE VALDEHORRAS
(Orense). Tels.: 988-310304 y 310414

Zona de BARCELONA, GERONA, I. BALEARES:
JOAN POCURULL. Apartado de Correos 206
GRANOLLERS (Barcelona). Tels.: 93-8492706/0022

Zona de ZARAGOZA, HUESCA:
ARACO. Camino B, s/n
LECIÑENA (Zaragoza) Tel.: 22

Zona del PAIS VASCO, SANTANDER, NAVARRA:
GRANJA DE SELECCION CUNICOLA "UNTZI"
Barrio Kampanxu, GERNIKA (Vizcaya)
Tels.: 94-6851365 y 6853072

Zona de BURGOS, SORIA, VALLADOLID, PALENCIA:
HIBRIDOS CASTELLANOS. Santa Catalina, 16
ARANDA DE DUERO (Burgos). Tels.: 947-501253/0587

Zona de ALICANTE, ALBACETE, MURCIA, JAEN,
CIUDAD REAL, CUENCA:
CUMASA. Rosario, 84. ALBACETE
Tels.: 967-229894 y 237046

SOLO SON CONEJOS HYLA LOS QUE LLEVAN EL CROTAL HYLA NUMERADO